© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

35. *Planorbis albus* Müll. h.
36. — *glaber* Jeff. s.
37. — *cristatus* Drap. s. s.
38. *Valvata alpestris* Blaun. h.
39. — *depressa* Pfr. s.
40. *Pisidium fossarinum* Cless. s. h.

Die Fauna des mittleren Donaugebietes vermehrt sich durch diese neuen Funde um 6 Arten.

Ich bin sehr gerne bereit, von den als h. und s. h. bezeichneten Arten im Tausche gegen Spezies anderer diluvialer Ablagerungen abzugeben.

Regensburg. S. Clessin.

Litteratur:

Hoyle, W. E., on the Cephalopoda. Supplementary Report XIV. In: Report Gov. Ceylon Pearl Oysters Fisheries in the Gulf of Manaar, by Herdmann, published by the Royal Society 1904. With 3 plates.

Neu Polypus herdmanni p. 187 pl. 1; — P. arborescens p. 189 t. 2 fig. 8, 9, 12, t. 3; — Ausserdem sind zahlreiche Jugendformen abgebildet.

Fischer, Henry, Considérations générales. In: Mission Pavie, Zoologie, Mollusques. 4°. 11 S. Paris 1904.

Allgemeine Betrachtungen über Molluskensystematik u. dgl., als Einleitung zu der Bearbeitung der von Pavie gesammelten Mollusken.

Strebel, H., Beiträge zur Kenntnis der Molluskenfauna der Magalhaen-Provinz. — In: Zoolog. Jahrb. Abt. Systematik 1904 Bd. 21 Heft 2. Mit 6 Taf.

Behandelt ausschliesslich die Gattung Trophon. Neu: Tr. ohlini; p. 203 t. 3 fig. 9; — paessleri p. 213 t. 7 fig. 56, mit var. turrita p. 215 t. 7 fig. 57; — elongatus p. 217 t. 7 fig. 58, t. 8 fig. 66; — pseudoelongatus p. 220, p. 221 t. 7 fig. 60; — albus p. 221 t. 7 fig. 61; — obesus p. 222 t. 7 fig. 62; — acuminatus p. 222 t. 7 fig. 63; — fenestratus p. 225 t. 7 fig. 59

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

— hoylei p. 217 t. 8 fig. 68, 69; — brucei p. 230 t. 8 fig. 72: — ornatus p. 231 t. 8 fig. 73; — standeni p. 331 t. é fig. 67 — couthouyi d. 236 t. 7 fig. 65, t. 8 fig. 76; — elegans p. 241 t. 8 fig. 71.

Jensen, A. S., Studier over nordiske Mollusker. III. Tellina (Macoma). — In: Vidensk-Meddel. naturh. Foren. Kopen. 1905. — Mit Tab. 1.

Der Autor unterscheidet aus dem Formenkreise der Tellina calcaria Chemn. nach den Sammlungen von Steenstrup noch 3 Arten: loveni Steenstr. p. 45 t. 1 fig. 5; — torelli Steenstr. p. 34 t. 1 fig. 3; — und moesta Desh. p. 38 t. 1 fig. 4. — Die Arten decken sich nicht mit den von Leche und Posselt unterschiedenen Formen.

Martini & Chemnitz, Conchylien Cabinet, neue Ausgabe. 1904.

Lfg. 491. Chitonidae (Schluss) und Vermetidae von Clessin. — Neu: Chiton glaber t. 41 fig. 4; — Ch. setiger var. kingi t. 42 fig. 8.

„ 492. Agnatha, von Kobelt. Keine n. sp.

„ 493. Agnatha, von Kobelt. Keine n. sp.

„ 494. Helix (I. 12. VI.) von Kobelt. Enthält ausschliesslich Pomatia. Neu oder zum erstenmal abgebildet sind: blumi p. 341 fig. 1—4; — adanensis globulosa und pyrami t. 341 fig. 7—10; — texta xeraethia Bourg. t. 342 fig. 1—3: — vulgaris tenuissima t. 342 fig. 11, 12; — vulgaris kubanensis t. 343 fig. 5—7; — nordmanni borshomensis t. 343 fig. 5—7; — nordmanni transitans t. 343 fig. 10—12; — figulina straubei, anthesi & attalus t. 344 fig. 7—11; — pelasgica n. (= figulina autor nec Parr.) t. 345 fig. 6—9; — var. rhodensis t. 346 fig. 4—7; — philibensis Pfr. t. 346 fig. 8—9; — escherichi Bttg. t. 346 fig. 10, 11.

Sturany, Dr. R., Kurze Diagnosen neuer Gastropoden: — In Akad. Anzeiger Akad. Wien 21. April 1904.

Als neu beschrieben werden: Planorbis (Gyraulus) argaeicus von Soisaly im Erdschinsgebiet, Kleinasien; — Pl. (Tropidiscus) cilicicus von Efrenk an der Südseite des cilicischen Taurus; — Bythinia pentheri von Soisaly; — Xerophila cappadocica von Nigde, Kleinasien; — Trichia memnonis aus dem Bulghar Dagh; — Brephulus alexandri von ebendort; — Chondrula ovularis var. codomanni von ebendort; — Amphiscopus lycaonicus vom

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Serai Dagh bei Konia; — Albinaria holtzi, Serrulina collasi und Pholeoteras euthrix (cfr. Nachrbl. No. 3).

Journal of Conchology, vol. 11 no. 4, October 1904.

p. 97. Jukes-Browne, A. J., on some Questions of Nomenclature.
„ 103. Madison, J., Testacella scutulum in Worcestershire.
„ 104. Thorneville, Rev. C. F., Obituary Notes on Philip Brooke Mason.
„ 106. Roebuck, W. Denison, Re-establishment of Limax tenellus as British Species.
„ 110. Collier, Ed., the Conchological Differences between the Genera and Sections of the Pupininae.
„ 115. Jackson, J. Wilfrid, Report on the Fleetwood Ramble.
„ 116. Oldham, Chas., W. D. Crick (Necrolog).
„ 117. Melvill, J. C. & Robert Standen, the Cypraeidae of the Persian Gulf, Gulf of Oman and North Arabian Sea. — Einige neue Varietäten.

Journal de Conchyliologie, vol. 52 no. 2.

p. 109. Dautzenberg, Ph. & G. F. Dollfus, Etudes critiques sur la nomenclature des genres Pectunculus et Glycimeris.
„ 123. Vayssière, A., Etude zoologique de l'Archidoris stellifera H. von Ihering.
„ 132. Lamy, Ed., Liste des Arches conservées avec etiquettes de Lamark daus les collections du Museum de Paris.

Caziot, —, Faune du tumulus de St. Cristophe près Grasse. In: Feuille jeunes Naturalistes Ser. IV Année 34 no. 406 (1904).

In der Kammer des Tumulus wurden ausser einer Anzahll Schalen lebender Mollusken auch die Schälchen einer Anzahl Nacktschnecken gefunden, von denen drei (Amalia guebhardi, subfossilis und L. duplex) von Pollonera für neu erklärt worden sind.

Künkel, Karl, zur Biologie des Limax variegatus. In: Zoolog. Anzeiger 1904 vol. XXVII No. 18 p. 571—578.

Eine sehr hübsche und sorgfältige Beobachtungsreihe, welche wir unseren Mitgliedern dringend zum Studium — und zur Nachahmung bei anderen Arten empfehlen.

Andreae, Prof. Dr. A., Dritter Beitrag zur Binnenconchylienfauna des Miocäns von Oppeln in Schlesien. — In: Mitteilungen Römer Museum, Hildesheim, No. 20, August 1904.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Es sind im Ganzen 60 Formen bekannt, davon 24—30 der Lokalität eigentümlich. Als neu beschrieben werden: Limax excavatus p. 4 fig. 1; — Amalia oppoliensis p. 4 fig. 2. mit var. ancyloides p. 5 fig. 3; — Punctum propygmaeum p. 6 fig. 4; — Pyramidula (Gonyodiscus) mamillata p. 7 fig. 5; — Hygromia (Fruticicola) neudorfensis p. 10 fig. 11; — Triptychia margaretae p. 12 fig. 12; — Acme callosiuscula p. 14 fig. 13; — Pseudotruncatella (n. gen., Typus: Pupa microceras A. Br.) pretiosa p. 16 fig. 14.

The Journal of Conchology vol. 11 no. 5.

p. 138. Scharff, R. F., the Origin of the Land-and Freshwater Mollusca, at present living in the British Islands. (Presidential Address).

„ 144. Taylor, Fred, Vivipara contecta var. atropurpurea nov. at Wicken Fen, Cambs.

„ 144. Hutton, W., Harrison, Limnaea stagnalis var. umbilicata.

„ 145. Dall, W. H., Note on the Name Glycymeris. Polemisirt gegen Dautzenberg & Dollfus.

„ 147. Dean, Davy, New Records for West Laucashire.

„ 147. Dean, J. Davy & J. Wilfrid Jackson, Notes on a Chara-and Shell Marl Deposit at Hawes Water, Silverdale, Lancashire.

Journal de Conchyliologie vol. 52 no. 4.

p. 285. Dautzenberg, Ph., Variations et cas teratologiques chez le Murex brandaris L. Avec pl. VIII. (var. robusta n., quadrispinosa n. f. 2. diplacantha n. var. fig. 3).

„ 288. Ancey, C. E., Notes critiques et synonymiques. — Vitrina comorensis Pfr. ist eine junge Helix aperta; — Rhytida beraudi Gass. = bisulcata Pfr.; — Streptaxis paradiscus Mlldff. = discus Pfr. — Ennea albida Putz. = Streptostele horei Smith; — Papuina barnaclei Smith ist alfredi var. trichroa Marts. und sicher nicht auf Hawaii einheimisch; — Helix primeana Crosse = connivens Pfr. major; — Hel. hidalgoiana Crosse = Trochomorpha zenobia Pfr.; — Hel. cailleti Crosse = gulosa Gould; — Hel. mabillei Crosse = corneo-virensPfr.; — taranaki Gray = delessertiana le Guillou, leucolena Crosse eine Varietät davon; — dillwyniana Pfr. ist nicht = desertorum Forsk. sondern = duroi Hidalgol (?); — Hel. neogranadensis Kobelt in Martini & Chemnitz t. 198 fig. 5 6 ist nicht die Pfeiffer'sche Art, sondern eine neue, welche den Namen Pleurodonte gudeana erhält; — Discolepis n. subg. für Hel. desidens Rang und Verwandte (p. 298); — Systrophia calculina Pfr. = heligmoidea juv.; —

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Strophocheilus mabillei Crosse = pulicarius Rve.; — Bul. pluto Crosse = tupacii d'Orb.; — Bul. acus Pfr. zu Coelostele zu stellen; — Bul. nuciformis Petit = nux Brod.; — Odont. inflatus var. costulata n. Brasilien; — Auriculella pulchra Pease = auricula var. major; — Pupa canaliculata Crosse = Gibbus uvula Desh.; — Succinea wrighti Crosse = lauta Gould; — Ctenoglypta n. subg. für Rotula newtoni Nevill und Verwandte (p. 306); — Chondropoma andrewsae ist ein Colobostylus; — Omphalotropis varians Mlldff. = poecila Ancey; — Pupina miokoana Mlldff. = beddomei Ancey; — Helicina euglypta Crosse = plicatula Pfr.; — Cyclophorus atomus Morelet ist wahrscheinlich ein Ditropis; — Papuina linterae Mlldff. = secans Hedley; — Pleurodonte auridens var. oligotricha n. p. 312; — Nakadaella n. subg. für Cyclotus micron Pilsbry Nautilus 1900 p. 120; — Diplommatina aesopus Bav. & Dautz. ist eine Leucarinia.

Eingegangene Zahlungen:

Prof. Erich Brandis, Travnik, Mk. 6.—; Karl Künkel, Ettlingen, Mk. 6.—; Dautzenberg, Paris, Mk. 6.—; Jos. Schedel, München, Mk. 6.—; Prof. Dr. F. Kinkelin, Frankfurt a. M., Mk. 6.—; Hermann Arnold, Nordhausen, Mk. 6.—; Lehrer W. Brandt, Cuxhaven, Mk. 6.—, Kurt Büttner, Leipzig, Mk. 12.—; Prof. Dr. K. v. Fritsch, Halle a. S. Mk. 24.—; Victor von Koch, Braunschweig, Mk. 6.—; Zoologisches Museum, Berlin, Mk. 12.—; C. Riemenschneider, Nordhausen, Mk. 12.—; Fürst zu Salm-Salm, Anholt, Mk. 12.—; S. Clessin, Regensburg, Mk. 12.—; Geh. Rat E. Friedel, Berlin. Mk. 12.—; A. Gysser, Strassburg, Mk. 6.—; G. Schacko, Berlin, Mk. 6.—; Königl. Hoheit Therese von Bayern, München, Mk. 12.—; Prof. Dr. K. Miller, Stuttgart, Mk. 6.—; Hartwig Petersen, Hamburg, Mk. 12.—; Robert Boog Watson, Edinburgh, Mk. 11.—; K. L. Pfeiffer, Kassel, Mk. 12.—; Dr. M. Meissner, Berlin, Mk. 6.—; Hermann Rolle, Berlin, Mk. 12.—; Prof. A. Krause, Gr.-Lichterfelde, Mk. 12.—; Prof. Karl Schmalz, Berlin, Mk. 6.—; Adrien Dollfuss, Paris, Mk. 18.—; E. Spandel, Nürnberg, Mk. 6.—; Paul Fagot, Villefranche, Mk. 6.—; A. Luther, Helsingfors, Mk. 6.—; Dr. Joh. Thiele, Berlin, Mk. 6.—; R. Jetschin, Patschkau, Mk. 6.—; Carlo Pollonera, Turin, Mk. 6.—; Sowerby & Fulton, London, Mk. 6.—; O. Retowski, Petersburg, Mk. 6.—; Zoologisches National-Museum, Agram, Mk. 12.—; Chas. W. Johnson, Boston, Mk. 6.—; E. Ninni, Venedig, Mk. 6.—; Richard Hagy, Upsala, Mk. 6.—; Joh. Tademand Lund, Kragéro, Mk. 6.—;